



Professional  
laboratory

UBT



## (تست تنفسی اوره)

- ۱ بیمار باید ۴ تا ۶ ساعت ناشتا باشد.
- ۲ عدم مصرف آنتی بیوتیک (ونکومايسين، نالیدیکسیک اسید، آمفوتریسین B و تری متو پریم) و ترکیبات بیسموت دار یک ماه قبل از تست.
- ۳ عدم مصرف آنتی اسید در ۵ روز گذشته.
- ۴ زدن مسواک و شستشوی دهان قبل از انجام آزمون الزامی است.
- ۵ چنانچه بیمار دندان مصنوعی دارد قبل از خوردن محلول از دهان خارج سازد.
- ۶ عدم مصرف امپرازول از ۱۴ روز قبل از تست. (سبب منفی کاذب می شود)
- ۷ عدم مصرف سایمتدین، رانی تیدین و فاموتیدین ۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل از انجام تست.
- ۸ چنانچه شرایط نمونه برداری برای انجام آزمایش را دارا میباشید داروی مربوط به انجام تست را از نمونه گیری تحویل بگیرید و بایک لیوان آب میل کنید.
- ۹ پس از گذشت ۱۵ دقیقه (B.C BREATH CARD) را باز کرده و آنرا از پوشش دور آن خارج کنید.
- ۱۰ بیمار باید در (B.C BREATH CARD) تا زمانی بدمد که اندیکاتور آن از نارنجی به زرد تغییر رنگ دهد، که ۴-۱ دقیقه طول میکشد بیمار می تواند جهت صحبت کردن یا تنفس B.C را از دهان خارج کند. در نهایت پس از تغییر رنگ کیسه را از دهان خارج و به مسنول نمونه گیری تحویل دهد.
- ۱۱ عدم استعمال دخانیات یک ساعت قبل از انجام تست.



۰۳۱-۳۶۲۴۶۲۰۴ خط ۲۰

اصفهان. سه راه حکیم نظامی



Fr-04-01-00